

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર
કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે અઠવાડિક સલાહ (૨૨ થી ૨૮ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬)
"આ સલાહ જે તે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી મુજબ પ્રસિધ્ધ કરેલ છે"

ખેત આબોહવા સલાહ

તારીખ	ઓગષ્ટ												સલાહ	
	વાસ્તવિક વરસાદ								ભારતીય હવામાન શાખાની આગાહી					
	૧૧-૧૭	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩	૨૪	૨૫	૨૬	૨૭		૨૮
ગુજરાત														કપાસનો પાક કળી અને ફૂલ અવસ્થામાં છે અને ખેતરો નીંદામણમુક્ત રાખવા. થ્રીપ્સ અને લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્યમાત્રાથી ઓછો છે. જુનાગઢ ખાતે ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ ૨ થી ૧૧ ઈયળો પ્રતિ ૨૦ ફુલો નોંધાયેલ છે. જુનાગઢ જીલ્લાનાં ધોરાજી, સુખપુર, માખાવડી અને લીબુડા એમ ૪ ગામો ખાતે મોજણી કરતા કપાસની ગોપાલ બીજી ૨, અંકુર ૩૦૨૮, રાશી-૬૫૯ અને ગજબ જેવી બીજી ૨ સંકર જાતોમાં સફેદ માખી અને લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ ઓછો જ્યારે ઉપરોક્ત ચાર સ્થળોએ થ્રીપ્સ અને ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્યમાત્રાથી વધુ જોવા મળેલ હતો. સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં વહેલી વાવણી કરેલ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન જોવા મળેલ હતું. સુરત જીલ્લામાં ઉમરપાડા ગામે અજીત ૧૫૫ બીજી ૨ માં લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્યમાત્રાથી વધુ હતો. વહેલી વાવણી કરેલ કપાસમાં ફૂલ અવસ્થાએ કપાસ મેન્યુલ માં દર્શાવેલ દવાનો છંટકાવ કરી શકાય. કપાસમાં રોગ જોવા મળેલ નથી. ફુદાઓની સંખ્યા ઓછી જોવા મળતી હોય તો ખેડુતોને ફક્ત ગુલાબી ઈયળનાં ફુદાઓને સમુહમાં પકડીને નાશ કરવા માટે પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ થી ૨૦ ફેરોમોન ટ્રેપો લગાડવાની સલાહ છે.
અમરેલી	૦	૦	૦	૧	૦	૦	૦	૦	૧૬	૧૫	૪	૩	૧૩	
ભાવનગર	૧	૦	૦	૫	૦	૦	૦	૦	૬	૧૪	૦	૦	૧૩	
જામનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૮	૧૮	૦	૦	૦	
રાજકોટ	૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૬	૧૫	૦	૦	૩	
ભરૂચ	૧૭	૦	૦	૩	૧	૦	૦	૦	૨૬	૮	૧૫	૦	૪	
સાંભરકાંઠા	૧૨	૦	૦	૦	૨	૬	૧૩	૩૬	૭૯	૫૯	૧૮	૦	૦	
સુરેન્દ્રનગર	૭	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૬	૯	૬	૦	૪	
અમદાવાદ	૮	૦	૦	૧	૧	૨	૩	૨	૪૬	૩૫	૦	૦	૧૩	
વડોદરા	૨૪	૦	૦	૦	૬	૧૦	૨	૧૦	૫૧	૧૧	૮	૦	૪	
પાટણ	૩	૦	૦	૦	૦	૦	૧	૨૦	૩૨	૨૭	૧૨	૧૧	૦	
મહેસાણા	૨	૦	૦	૦	૧	૪	૩	૧૪	૭૯	૫૪	૧૪	૦	૦	

નોંધ					
વરસાદ (મીમી)	< ૫	૫-૨૦	૨૦-૫૦	૫૦-૮૦	> ૮૦

સ્ત્રોત : http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm