

ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (22 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2016) ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ

“ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ”

ਮਿਤੀ	ਮੀਂਹ ਪਿਆ						ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ							ਸਲਾਹ
	11to17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ਪੰਜਾਬ														ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ-ਡੋਡੀ ਅਤੇ ਟੀਡੇਂ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਉਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਚ. 773 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਉੱਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗ੍ਰੇਡ I ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ III ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼/ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਵਿਲਟ ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਪੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਕੋਬਾਲਿਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਉਪਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿਉ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਸਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ	0	0	5	0	0	18	0	0	4	4	0	7	9	
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	8	0	5	0	0	0	0	0	4	4	0	7	9	
ਮੁਕਤਸਰ	55.6	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	7	9	
ਮਾਨਸਾ	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	7	
ਹਰਿਆਣਾ														
ਸਿਰਸਾ	2.8	0	1.3	0	0	2.5	0	0	12	0	4	0	14	
ਹਿਸਾਰ	5.2	0	1.9	0	0	0	0	0	12	0	4	0	14	
ਫਤਿਹਾਬਾਦ	9.3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	14	
ਰਾਜਸਥਾਨ														
ਹੰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ	1.3	0	0.6	0	0	0	0	0	10	11	12	10	8	
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ	5.3	0	2.6	0	0.5	0	0	0.5	10	11	12	10	8	
ਬਾਂਸਵਾੜਾ	12.9	0	0	0	24.1	96.8	18.5	33.4	8	8	9	10	8	

												<p>ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਖੈਦਰ ਅਤੇ ਮਦੋਸਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ, ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧੂਵਾਲੀ, 1 ਵਾਈ, ਕਾਲੀਆ, ਸੂਜਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਚ. 773, ਬਾਇਓ 6588 ਅਤੇ ਬਾਇਓ 6488 ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਸਰਵਾ, ਤਾਈਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮੇਸਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਟੀ. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ/ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਬੀਜੀ II, ਪਾਰਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ II ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਕੋਟ ਬੀ ਜੀ II ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਭੂਰੀ ਜੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--