ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર

કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે અઠવાડિક સલાહ (૨૬ સપ્ટેમ્બર થી ૨ ઓકટોબર, ૨૦૧૬)

"આ સલાહ જે તે રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી મુજબ પ્રસિધ્ધ કરેલ છે"

ખેત આબોહવા સલાહ

	સપ્ટેમ્બર										ઓકટોબર		
	વાસ્તવિક વરસાદ							ભારતીય હવામાન શાખાની આગાહી					સલાહ
તારીખ	૧૫ થી ૨૧	૨૧	૨૨	૨૩	૨૪	૨૫	૨૬	૨૭	૨૮	૨૯	૩૦	૧	૨	
ગુજરાત														ગુજરાત રાજયનાં કપાસ ઉગાડતાં મહત્તમ વિસ્તારમાં કપાસનો પાક જીંડવા વિકાસની અવસ્થાએ છે. છુટો–છવાયો વરસાદ પડતાં આંતર ખેડ જેવાં ખેતી કાર્યોમાં મુશ્કેલી પડેલ હતી. ભરૂચ જીલ્લાનાં પાંચ ગામોમાં બોલગાર્ડર–૨ બીટી સંકરોમાં જીવાતનાં ઉપદ્રવની મોજણી કરતાં તુણા, સોડગામ અને કરસાડ ગામડાઓમાં બે સ્થળોએ અને લુણામાં એક સ્થળે લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ હતો. તુણા અને પણસોલી ગામડામાં એક સ્થળે થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ હતો. તુણા ખાતે બે અને સોડગામ ખાતે એક સ્થળોએ ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ હતો. જુનાગઢ જીલ્લાનાં છ ગામડાઓમાં મોજણી કરતાં પ્રભાતપુર અને બારડીયા ગામડાનાં એક સ્થળોએ ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ હતો. બાગડુ ગામડાનાં એક સ્થળે એટીએમ બીજી–૨ સંકર કપાસમાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ હતો.
અમરેલી	૧૯૪	૧૧	૦	૦.૭	૦.૬	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૦	
ભાવનગર	૧૪૭.૪	૨.૯	૦	૦.૮	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૦	
જામનગર	૧૧.૭	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
રાજકોટ	૮૨.૫	૯.૯	૦	૧.૯	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૧૦	
ભરૂચ	૭૫.૩	૦.૭	૪.૮	૨.૮	૮	૬.૯	૨.૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
સાંબરકાંઠા	૮.૭	૦	૨.૨	૧.૭	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
સુરેન્દ્રનગર	૧૧.૫	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
અમદાવાદ	૨૩.૨	૦	૧.૫	૦.૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
વડોદરા	૭૦.૨	૦	૧૨.૭	૮.૨	૦.૪	૨.૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
પાટણ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
મહેસાણા	૩.૯	૦	૦	૦.૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	

નોંધ					
વરસાદ (મીમી)	< ૫	૫–૨૦	૨૦–૫૦	૫૦–૮૦	> ૮૦

સ્ત્રોત : http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm