

**ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર**  
**કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે અઠવાડિક સલાહ (૩ થી ૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬)**  
**"આ સલાહ જે તે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી મુજબ પ્રસિધ્ધ કરેલ છે"**

**ખેત આબોહવા સલાહ**

તારીખ	વાસ્તવિક વરસાદ													ભારતીય હવામાન શાખાની આગાહી	સલાહ
	સપ્ટેમ્બર				ઓક્ટોબર										
તારીખ	૨૨ થી ૨૮	૨૮	૨૯	૩૦	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯		
<b>ગુજરાત</b>														ગુજરાત રાજ્યનાં કપાસ ઉગાડતાં મહત્તમ વિસ્તારમાં કપાસનો પાક જીંડવા વિકાસની અવસ્થાએ છે. ભરૂચ જિલ્લાનાં પાંચ ગામોમાં બોલગાર્ડર-૨ બીટી સંકરોમાં જીવાતનાં ઉપદ્રવની મોજણી કરતાં ચાસવડ, ઈતકલા અને પીઠોર ગામે બે સ્થળોએ અને ચાંડીયા, હિંગાલીયા અને સુડી ગામોનાં એક સ્થળે લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ હતો. પીઠોર ખાતે એક સ્થળે ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ હતો. જુનાગઢ જિલ્લાનાં છ ગામડાઓમાં મોજણી કરતાં પ્રભાતપુર ગામનાં એક સ્થળે ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ હતો. ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે હેક્ટર દીઠ ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ તાત્કાલિક અસરથી લગાડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.	
અમરેલી	૧.૩	૦	૦	૦	૦	૦	૮.૨	૨૦.૪	૩૯	૫૯	૬	૪૫	૪૩		
ભાવનગર	૦.૮	૦	૦	૦	૦	૧.૬	૫.૮	૨૪.૮	૨૫	૧૨	૬૦	૪૫	૪૩		
જામનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૧.૨	૦.૮	૬.૨	૧૯	૧૫	૨૦	૧૫	૧૦		
રાજકોટ	૧.૯	૦	૦	૦	૦	૦	૦.૬	૧૯.૬	૨૫	૪૦	૪૦	૪૫	૪૩		
ભરૂચ	૨૪.૬	૦	૦	૦	૦	૦.૪	૮.૧	૩.૪	૩૦	૬૦	૩૨	૨૫	૨૦		
સાંબરકાંઠા	૩.૯	૦	૦	૦	૦	૫.૭	૧.૨	૫.૮	૧૦	૧૧	૩	૦	૫		
સુરેન્દ્રનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦.૨	૦.૨	૧૪.૮	૧૧	૧૧	૧૧	૧૦	૧૦		
અમદાવાદ	૧.૯	૦	૦	૦	૦	૫.૭	૧.૩	૧૭.૬	૨૫	૨૫	૩૦	૩૦	૩૫		
વડોદરા	૨૩.૭	૦	૦.૧	૦	૦	૦.૪	૬.૩	૫.૨	૬૨	૫૫	૪૦	૨૪	૧૯		
પાટણ	૦	૦	૦	૦	૦	૧૦.૮	૦.૩	૭.૭	૪	૦	૦	૦	૦		
મહેસાણા	૦.૨	૦	૦	૦	૦	૯.૨	૦	૫.૭	૫	૩	૧૧	૧૨	૧૫		

નોંધ					
વરસાદ (મીમી)	< ૫	૫-૨૦	૨૦-૫૦	૫૦-૮૦	> ૮૦

સ્ત્રોત : [http://nwp.imd.gov.in/bias/dist\\_fcst.htm](http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm)